neodisher® PolyKlar

Środek płuczący do maszynowej obróbki klatek dla zwierząt



Obszary zastosowania:

Mycie klatek dla zwierząt oraz akcesoriów takich jak stojaki klatek, sprzęt do przechowywania i transportu podczas obróbki maszynowej.

Zakres działania:

- Znacznie poprawia i przyspiesza schnięcie, w szczególności materiałów z tworzywa sztucznego.
- Nadaje się do typowych materiałów stosowanych w hodowli zwierząt, np. polisulfonu, poliwęglanu, polifenylosulfonu i polieteroimidu.

Szczególne właściwości:

- Nie zawiera tenzydów o właściwościach kwasowych, neutralizuje pozostałości zasadowe.
- Doskonała kompatybilność materiałowa, zapobiega powstawaniu rys podczas sterylizowania.
- Niegroźny pod względem toksykologicznym.

Użycie i dozowanie:

neodisher PolyKlar jest stosowany w specjalnych urządzeniach do mycia klatek dla zwierząt i akcesoriów typu stojaki klatek, sprzęt do przechowywania i transportu. Dozowana ilość zależy m.in. od materiału płukanego przedmiotu i wynosi 0,5–2,0 ml/l.

Do dozowania należy stosować odpowiednie urządzenia dozujące.

Do maszynowego mycia klatek dla zwierząt i akcesoriów zalecamy stosowanie środka myjącego neodisher LaboClean FLA w obróbce alkalicznej i środka myjącego neodisher N w obróbce kwasowej.

Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozowania z wężami ssącymi.
- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi producentów urządzeń do mycia.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów klatek dla zwierząt oraz zaleceń grupy roboczej ds. przygotowywania klatek (AK KAB) w aktualnej broszurze AK KAB „Przygotowanie klatek w hodowli zwierząt”.

Dane techniczne:

Wartość pH	3,6–3,2 m/l (0,5–2 ml/l, określona w wodzie demineralizowanej, 20°C)
Gęstość	ok. 1,0 g/cm^3 (20°C)
Lepkość	< 10 mPa s (koncentrat, 20°C)

Skład:

Zawartość składników środka myjącego według rozporządzenia w sprawie detergentów WE 648/2004:
< 5% polikarboksylany
ponadto środek konserwujący (metylochloroizotiazolinon/metyloizotiazolinon)

Magazynowanie:

Należy przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C. W prawidłowych warunkach można przechowywać do 3 lat. Termin przydatności: patrz nadruk na etykiecie za symbolem ⌛.

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w kartach charakterystyki. Są one dostępne na stronie www.drweigert.com/pl w części „Pliki do pobrania”.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 4019/3-2 Stan: 09/2020

Informacje w niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób. Na tej podstawie nie można przyjmować żadnych wiążących prawnie zapewnień o określonych właściwościach.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Faks: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www drweigert.com