# neoform MED rapid

## Środek do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych

Roztwór gotowy do użycia

### Obszary zastosowania:

- Do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych (jak np. stoły operacyjne) w szpitalach oraz gabinetach lekarskich i stomatologicznych

### Zakres działania:

- Działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze i bójcze wobec prątków gruźlicy potwierdzono badaniami według metod VAH[1] i EN[2]. Ograniczone działanie wirusobójcze potwierdzono badaniami według metod RKI/DVV[3]
- Dodatkowo ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (skuteczność wobec norowirusów i adenowirusów) oraz skuteczny wobec rotawirusów
- Dezynfekowane powierzchnie powinny być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu
- Nie nadaje się do dezynfekcji szkła akrylowego (pleksiglasu)
- W wykazie VAH[1]
- Wpisany na listę środków dezynfekcyjnych IHO[4]

### Szczególne właściwości:

- Szerokie spektrum działania nawet przy krótkim czasie kontaktu
- Wysycha szybko, nie pozostawiając śladów; nie wymaga spłukiwania
- Nie zawiera aldehydów, substancji zapachowych ani barwników

### Użycie i dozowanie:

Nanieść nierozcieńczony neoform MED rapid na umyte, suche powierzchnie, a następnie je przetrzeć. Powierzchnie muszą być całkowicie spryskane środkiem neoform MED.
W zależności od wybranej skuteczności dezynfekcji należy przestrzegać wymienionych poniżej czasów oddziaływania.

| | Małe obciążenie, 20°C (wstępnie umyte powierzchnie) |
|---|---|
| działanie bakteriobójcze (VAH[1], EN 13727, EN 16615) | nierozcieńczony, 1 min |
| działanie drożdżakobójcze (VAH[1], EN 13624, EN 16615) | nierozcieńczony, 1 min |
| działanie grzybobójcze (EN 13624) | nierozcieńczony, 20 min |
| działanie bójcze wobec prątków gruźlicy (EN 14348) | nierozcieńczony, 30 s |
| działanie wirusobójcze w ograniczonym stopniu (w tym HIV, HBV, HCV) (EN 14476, RKI/DVV[3]) | nierozcieńczony, 15 s |
| działanie wirusobójcze PLUS w ograniczonym stopniu (adenowirusy, norowirusy, w tym wszystkie wirusy osłonkowe) (EN 14476) | nierozcieńczony, 2 min |
| skuteczny wobec norowirusów (MNV[5]) (EN 14476) | nierozcieńczony, 2 min |
| skuteczny wobec adenowirusów (EN 14476) | nierozcieńczony, 1 min |
| skuteczny wobec rotawirusów (EN 14476) | nierozcieńczony, 1 min |
| W wykazie VAH[1] | nierozcieńczony, 5 min |

Z powodu zawartości alkoholu neoform MED rapid nie powinien być stosowany w dużej ilości (używać maksymalnie 50 ml środka na 1 $m^2$ dezynfekowanej powierzchni i nie więcej niż 100 ml na 1 $m^2$ ogólnej powierzchni pomieszczenia). Proszę się zapoznać z zaleceniami dotyczącymi zagrożeń i bezpieczeństwa oraz ich przestrzegać!

### Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

# neoform MED rapid

- Ekonomiczne i bezpieczne dozowanie umożliwia zastosowanie ręcznych urządzeń dozujących (w tej sprawie prosimy o kontakt).
- Zaleca się noszenie rękawic podczas ręcznej pracy z zastosowaniem środków dezynfekujących.
- Proces obróbki musi być zgodny z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych i obowiązującymi zasadami oraz wykonany za pomocą odpowiednich zatwierdzonych metod.
- Przy obróbce należy przestrzegać zaleceń producentów wyrobów medycznych i powierzchni.
- Nie mieszać z innymi produktami.

## Ekspertyza:

Działanie dezynfekujące zostało potwierdzone odpowiednimi badaniami. Ekspertyzę udostępniamy na życzenie.

## Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Lepkość | < 10 mPa s (nierozcieńczony, 20°C) |
| Gęstość | ok. 0,9 g/cm$^3$ (20°C) |
| Punkt zapłonu | 27°C według normy DIN 22719 |

## Skład:

Substancje czynne w 100 g:
35,0 g propan-1-ol
25,0 g etanol

## Oznakowanie CE: CE 0297 MD

neoform MED rapid spełnia europejskie wymagania dotyczące wyrobów medycznych.

Jeżeli dojdzie do poważnego zdarzenia z tym produktem, należy niezwłocznie zgłosić to producentowi i właściwym organom.

## Magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturach od -15 do 25°C. Przy prawidłowym magazynowaniu okres ważności wynosi 3 lata. Termin przydatności: patrz nadruk na etykiecie za symbolem ⌛.

## Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki. Jest ona dostępna na stronie www.drweigert.com/pl w części „Pliki do pobrania”.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

MB 4070/3-5 Stan: 11/2020

1 Niemieckie Stowarzyszenie Higieny Stosowanej
2 Europejskie metody badawcze
3 Na podstawie wytycznych badań Instytutu Roberta Kocha (RKI) i Niemieckiego Stowarzyszenie Zwalczania Chorób Wirusowych (DVV)
4 Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Higieny i Ochrony Powierzchni
5 Mysi norowirus

Informacje w niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej wiedzy i doświadczeniach. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób. Na tej podstawie nie można przyjmować żadnych wiążących prawnie zapewnień o określonych właściwościach.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
faks: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.de